



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

ACETAB 325

Hoạt chất:

Paracetamol

Nồng độ/hàm lượng:

325 mg

Nhóm thuốc:

Thuốc giảm đau, hạ sốt

Dạng bào chế:

Viên nén bao phim

Nhà sản xuất:

Agimexpharm - Việt Nam

Chỉ định:	- Hạ sốt. - Giảm đau từ nhẹ đến vừa: Nhức đầu, đau răng, đau họng, đau nhức cơ xương, đau do viêm khớp.
Cách sử dụng:	Thuốc được dùng theo đường uống
Liều dùng thông thường:	Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường cho trẻ em: – Trẻ em từ 2 – 5 tuổi: Uống ½ viên/ lần. – Trẻ em từ 6 – 11 tuổi: Uống 1 viên/ lần. – Trẻ em trên 11 tuổi: Uống 1 – 2 viên/ lần. Các liều cho trẻ em có thể nhắc lại sau 4 – 6 giờ nếu cần, không quá 4 lần/ 24 giờ.
Tác dụng phụ:	Thuốc có thể gây một số phản ứng không mong muốn, bao gồm dị ứng, khó chịu tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến gan và thận khi dùng liều cao trong thời gian dài. Một số trường hợp hiếm có thể gặp vấn đề về máu hoặc phản ứng quá mẫn. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, vàng da hoặc phản ứng dị ứng, hãy ngừng thuốc và báo ngay cho bác sĩ.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	1. Nhận thức về các nguy cơ: Dùng quá liều có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng. Không sử dụng nhiều loại thuốc chứa paracetamol cùng lúc. Cần trọng khi dùng chung với thuốc trị ho, cảm lạnh hoặc thuốc giảm đau khác để tránh quá liều. 2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ: Ngừng thuốc và báo ngay cho bác sĩ nếu trẻ có dấu hiệu như vàng da, đau bụng, buồn nôn kéo dài, dị ứng (phát ban, sưng mắt, khó thở). 3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác: Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng chung với thuốc điều trị cảm cúm, sốt, hoặc các loại thuốc khác để tránh tương tác không mong muốn. Nếu trẻ có bệnh lý về gan, thận hoặc đang dùng thuốc điều trị khác, cần báo với bác sĩ trước khi sử dụng. 4. Những lời khuyên cho bệnh nhân: Dùng đúng liều lượng theo cân nặng và không vượt quá số liều quy định trong ngày. Không sử dụng thuốc dành cho người lớn thay thế cho trẻ em. Uống đủ nước trong khi dùng thuốc để hỗ trợ đào thải và giảm nguy cơ tác dụng phụ