



**THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN**

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



<b>TÊN THUỐC</b>	<b>AESCIN 20mg</b>
<b>Hoạt chất:</b>	Aescin
<b>Nồng độ/hàm lượng:</b>	20 mg
<b>Nhóm thuốc:</b>	Thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm không steroid
<b>Dạng bào chế:</b>	Viên nén bao phim
<b>Nhà sản xuất:</b>	Agimexpharm - Việt Nam

<b>Chỉ định:</b>	- Điều trị thiếu năng tĩnh mạch mãn tính, giãn tĩnh mạch chân, trĩ. - Điều trị viêm tĩnh mạch chân. - Phòng và điều trị tụ máu, chống viêm, chống phù nề sau phẫu thuật và chấn thương.
<b>Cách sử dụng:</b>	Thuốc dùng bằng đường uống, uống sau khi ăn và uống với nhiều nước
<b>Liều dùng thông thường:</b>	Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường: Sử dụng 1-2 viên/lần x 2-3 lần/ngày
<b>Tác dụng phụ:</b>	Thuốc có thể gây ra một số tác dụng phụ hiếm gặp, bao gồm: - Dị ứng: Có thể xuất hiện phát ban, nổi mề đay. - Tiêu hóa: Có thể gây khó chịu dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ.
<b>Khuyến cáo cho bệnh nhân:</b>	1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc: Dị ứng: Một số người có thể gặp phản ứng quá mẫn, bao gồm phát ban hoặc khó chịu trên da. Suy thận: Không nên sử dụng thuốc nếu bạn đang bị suy thận cấp. Thành phần phụ: Thuốc có chứa chất tạo màu (E110), có thể gây dị ứng ở một số người nhạy cảm. 2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ: Xuất hiện phản ứng dị ứng như nổi mề đay, phát ban hoặc sưng mắt. Đau bụng, khó chịu đường tiêu hóa kéo dài. 3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác: Không dùng chung với các sản phẩm có chứa galactose nếu bạn có tiền sử không dung nạp đường này. Nếu đang dùng thuốc điều trị bệnh khác, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh tương tác thuốc. 4. Những lời khuyên cho bệnh nhân: Uống thuốc cùng thức ăn để giảm kích ứng dạ dày. Uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ chức năng thận. Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc, bạn có thể tiếp tục các hoạt động này bình thường.