



### THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



#### TÊN THUỐC

**AgiEtoxib 60 mg**

**Hoạt chất:**

Etoricoxib

**Nồng độ/hàm lượng:**

60 mg

**Nhóm thuốc:**

Thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm không steroid

**Dạng bào chế:**

Viên nén bao phim

**Nhà sản xuất:**

Agimexpharm - Việt Nam

<b>Chỉ định:</b>	Chỉ định cho người lớn và thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên trong các trường hợp sau: - Điều trị cấp tính và mãn tính các dấu hiệu và triệu chứng bệnh thoái hoá khớp và viêm khớp dạng thấp. - Điều trị viêm đốt sống dính khớp. - Điều trị viêm khớp Gút cấp tính. - Điều trị các cơn đau cấp tính, bao gồm chứng đau bụng kinh nguyên phát. - Điều trị ngắn hạn
<b>Cách sử dụng:</b>	Nuốt cả viên thuốc cùng với một cốc nước. Nên dùng thuốc vào cùng một thời điểm trong ngày, có thể uống cùng hoặc không cùng với thức ăn. Tốt nhất là uống cùng với thức ăn
<b>Liều dùng thông thường:</b>	Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường: Sử dụng 1-3viên/ngày
<b>Tác dụng phụ:</b>	Có thể gây một số tác dụng phụ như: - Thường gặp: Rối loạn tiêu hóa: viêm dạ dày, đầy hơi, táo bón, tiêu chảy, nhức đầu, chóng mặt, tăng huyết áp, phù, loạn nhịp tim, tăng men gan. - Ít gặp: Nhiễm trùng (hô hấp, tiết niệu), giảm bạch cầu, thiếu máu, rối loạn tâm thần (trầm cảm, ảo giác), tai biến mạch máu não, ù tai. - Hiếm gặp: Phản ứng phản vệ, phù mạch, suy gan, hội chứng Stevens-Johnson, tăng natri máu.
<b>Khuyến cáo cho bệnh nhân:</b>	1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc: Thuốc có thể làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ khi sử dụng lâu dài. Có nguy cơ viêm loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, đặc biệt ở người cao tuổi. Một số trường hợp hiếm gặp có thể gây phản ứng da nghiêm trọng hoặc dị ứng nặng. 2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ: Xuất hiện đau ngực, khó thở, phù chân hoặc mệt mỏi bất thường. Vàng da, nước tiểu sẫm màu, buồn nôn hoặc chán ăn kéo dài. Phát ban, sưng mắt, ngứa nghiêm trọng hoặc khó thở. 3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác: Không tự ý dùng aspirin, thuốc chống viêm khác hoặc thuốc chống đông máu. Thận trọng khi dùng chung với thuốc trị tiểu đường, tăng huyết áp hoặc thuốc lợi tiểu. Luôn hỏi bác sĩ nếu đang dùng thuốc khác để tránh tương tác bất lợi. 4. Những lời khuyên cho bệnh nhân: Uống thuốc cùng thức ăn để giảm kích ứng dạ dày. Tránh rượu, thuốc lá để giảm nguy cơ tác dụng phụ. Hạn chế tiếp xúc ánh nắng, sử dụng kem chống nắng nếu cần. Uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ chức năng thận. Nếu gặp bất kỳ triệu chứng bất thường nào, ngừng thuốc và liên hệ bác sĩ ngay.