



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

Hoạt chất:
Nồng độ/hàm lượng:
Dạng bào chế:
Nhà sản xuất:

ALPHADHG

Chymotrypsin
21 microkatal (tương đương 4200 USP unit)
Viên nén
Được Hậu Giang - Việt Nam

Chỉ định:	Điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng
Cách sử dụng:	AlphaDHG 4200 DHG 2X10 là thuốc dùng ngâm dưới lưỡi
Liều dùng thông thường:	Liều thông thường: Người lớn: Ngâm dưới lưỡi, mỗi lần 1-2 viên, ngày 3-4 lần
Tác dụng phụ:	Thuốc này có thể gây ra một số tác dụng phụ thường gặp và hiếm gặp: - Tác dụng phụ thường gặp: Tăng nhất thời nhãn áp, phù giác mạc, viêm nhẹ màng bồ đào (khi dùng trong nhãn khoa). - Tác dụng phụ ít gặp: Phản ứng dị ứng (ngứa, phát ban, sưng mắt) khi dùng liều cao do chymotrypsin có tính kháng nguyên.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	<ol style="list-style-type: none">Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc Dị ứng: Không dùng nếu từng có phản ứng dị ứng với chymotrypsin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. Không sử dụng ở bệnh nhân có nguy cơ giảm alpha - 1 antitrypsine như: Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, khí phế thũng, hội chứng thận hư Phẫu thuật mắt: Không khuyến cáo sử dụng cho người dưới 20 tuổi hoặc có đục nhân mắt bẩm sinh. Tăng áp suất dịch kính: Không sử dụng nếu có vết thương hở ở mắt hoặc tăng áp suất dịch kính.Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ Dấu hiệu dị ứng: Phát ban, sưng mắt, môi, họng hoặc khó thở. Vấn đề về thị giác: Mắt mờ, đau mắt, đỏ kéo dài hoặc sưng.Chảy máu bất thường: Xuất hiện vết bầm tím, chảy máu kéo dài khi dùng chung với thuốc kháng đông.3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác Tránh dùng chung với acetylcystein, vì có thể làm giảm hiệu quả của thuốc. Không phối hợp với thuốc kháng đông nếu không có chỉ định của bác sĩ để tránh nguy cơ chảy máu kéo dài.4. Những lời khuyên cho bệnh nhân Dùng đúng liều: Không tự ý tăng hoặc giảm liều mà không có hướng dẫn của bác sĩ. Không sử dụng kéo dài: Chỉ dùng thuốc trong thời gian cần thiết để tránh tác dụng phụ. Phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không nên sử dụng do chưa có đủ dữ liệu về độ an toàn. Bệnh nhân có bệnh lý phổi hoặc thận: Cần thông báo với bác sĩ trước khi sử dụng.