




THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

Hoạt chất:

Nồng độ/hàm lượng:

Nhóm thuốc:

Dạng bào chế:

Nhà sản xuất:

BREXIN

Piroxicam

20mg

Thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm không steroid

Viên nén

Chiesi Farmaceutici S.p.a - Ý

Chỉ định:	Giảm các triệu chứng do viêm xương khớp (bao gồm cả thoái hoá khớp), viêm khớp dạng thấp hoặc viêm cột sống dính khớp
Cách sử dụng:	Dùng qua đường uống, uống sau khi ăn. Đề chia đôi viên thuốc, để viên thuốc lên mặt phẳng, rãnh khía ở mặt trên, ấn nhẹ bằng ngón tay cái, viên thuốc sẽ được bẻ đôi thành hai phần bằng nhau
Liều dùng thông thường:	Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường: Sử dụng 1 viên/ngày
Tác dụng phụ:	Thuốc có thể gây khó chịu dạ dày, buồn nôn, đầy hơi hoặc đau đầu nhẹ. Một số trường hợp có thể thấy chóng mặt, buồn ngủ hoặc phản ứng da nhẹ như phát ban. Thuốc có thể ảnh hưởng đến huyết áp, thận hoặc gây phản ứng dị ứng.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	<ol style="list-style-type: none">Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc: Thuốc có thể làm tăng nguy cơ tim mạch nếu sử dụng lâu dài. Nguy cơ gây loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, đặc biệt ở người cao tuổi. Một số trường hợp hiếm gặp có thể gây phản ứng dị ứng hoặc tác dụng phụ nghiêm trọng trên da.Dấu hiệu cảnh báo cần báo cho bác sĩ: Đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn ra máu, phân đen hoặc có máu. Phát ban, sưng mắt, khó thở hoặc dấu hiệu dị ứng khác. Bầm tím không rõ nguyên nhân, chảy máu kéo dài hoặc thay đổi nước tiểu.Tham khảo ý kiến bác sĩ khi dùng chung với thuốc khác: Không tự ý dùng aspirin, thuốc chống viêm khác hoặc thuốc chống đông máu. Thận trọng khi dùng chung với thuốc điều trị tiểu đường, tăng huyết áp hoặc thuốc lợi tiểu. Nếu đang sử dụng bất kỳ thuốc nào khác, hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.Những lời khuyên cho bệnh nhân: Uống thuốc cùng thức ăn để giảm kích ứng dạ dày. Tránh rượu và thuốc lá để giảm nguy cơ tác dụng phụ. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, sử dụng kem chống nắng nếu cần. Uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ chức năng thận. Nếu cảm thấy buồn ngủ hoặc chóng mặt, tránh lái xe hoặc làm việc cần sự tập trung.