



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

Hoạt chất:

Nồng độ/hàm lượng:

Nhóm thuốc:

Dạng bào chế:

Nhà sản xuất:

CIFGA

Ciprofloxacin

500mg

Kháng sinh

Viên nén bao phim

Dược Hậu Giang - Việt Nam

Chỉ định:	Điều trị nhiễm trùng: - Viêm xương tủy, viêm khớp nhiễm khuẩn - Nhiễm khuẩn da và mô mềm: Điều trị viêm mô tế bào, áp-xe, nhiễm trùng vết mổ do vi khuẩn nhạy cảm - Nhiễm trùng khác
Cách sử dụng:	Nên uống nhiều nước trong quá trình dùng thuốc. Uống thuốc 2 giờ sau bữa ăn.
Liều dùng thông thường:	Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường: Người lớn: 1 viên x 2 lần/ngày
Tác dụng phụ:	Có thể gây ra một số tác dụng phụ như sau: - Thường gặp: Buồn nôn, tiêu chảy, nôn mửa, đau hoặc khó chịu vùng bụng. - Ít gặp: Đau đầu, bồn chồn, phát ban.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	<ol style="list-style-type: none">Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc Dị ứng nghiêm trọng: Thuốc có thể gây phản ứng dị ứng nặng như phát ban, sưng môi, mặt, họng hoặc khó thở. Nếu gặp triệu chứng này, ngừng thuốc ngay và báo bác sĩ. Viêm và đứt gân: Có thể gây viêm hoặc đứt gân, đặc biệt ở người cao tuổi, người đang dùng corticosteroid hoặc sau ghép tạng. Báo ngay cho bác sĩ nếu thấy đau hoặc sưng ở gót chân hoặc các vùng gân khác. Tổn thương thần kinh: Một số người có thể bị tê bì, cảm giác kim châm hoặc yếu cơ. Nếu gặp triệu chứng này, ngừng thuốc và báo bác sĩ. Nhạy cảm với ánh sáng: Ciprofloxacin có thể làm da dễ bắt nắng, gây đỏ rát hoặc bỏng nắng. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và sử dụng kem chống nắng. Tiêu chảy kéo dài: Nếu bị tiêu chảy nặng, phân có máu hoặc đau bụng kéo dài, cần báo ngay cho bác sĩ vì có thể liên quan đến viêm ruột.Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ Xuất hiện phát ban, ngứa, sưng mặt, môi hoặc khó thở. Tiêu chảy kéo dài, phân có máu hoặc đau bụng dữ dội. Đau hoặc viêm gân, đặc biệt ở gót chân. Chóng mặt, lú lẫn, tê bì hoặc yếu cơ bất thường.Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác Không tự ý dùng cùng các thuốc chống viêm, thuốc giảm đau hoặc thực phẩm chức năng mà không có sự đồng ý của bác sĩ. Tránh uống thuốc cùng với sữa, nước ép canxi hoặc thực phẩm giàu canxi. Nên uống cách ít nhất 2 giờ trước hoặc 6 giờ sau khi dùng các sản phẩm này.Những lời khuyên cho bệnh nhân Giảm nguy cơ nhạy cảm ánh sáng: Tránh nắng và sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài. Tuân thủ liệu trình: Uống thuốc đúng liều và đúng thời gian bác sĩ kê, không tự ý ngừng thuốc để tránh vi khuẩn kháng thuốc. Duy trì lượng nước: Uống đủ nước mỗi ngày để bảo vệ thận và giảm nguy cơ tác dụng phụ. Cẩn trọng khi lái xe: Nếu cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ hoặc rối loạn thần kinh, không nên lái xe hoặc vận hành máy móc.