



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

Hoạt chất:

Nồng độ/hàm lượng:

Nhóm thuốc:

Dạng bào chế:

Nhà sản xuất:

CODALGIN FORTE

Paracetamol + Codeine

500mg + 30mg

Thuốc giảm đau, hạ sốt dạng phối hợp

Viên nén

Aspen Pharma Pty Ltd - Úc

Chỉ định:	Giảm đau nhẹ đến vừa như chứng viêm khớp thấp khớp, đau họng, đau đầu Hạ sốt trong các trường hợp sốt trên 39 độ do đau tai, đau nửa đầu Ngoài ra còn giúp giảm ho, an thần, gây ngủ nhưng rất ít
Cách sử dụng:	Dùng đường uống, uống sau ăn.
Liều dùng thông thường:	Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường: - Người lớn, trẻ trên 12 tuổi uống 1-2 viên/lần, lặp lại ít nhất sau 4 giờ, không quá 8 viên/ngày. - Trẻ 7-12 tuổi uống 1/2 viên/lần, lặp lại ít nhất sau 4 giờ, không quá 3 viên/ngày. - Không dùng thuốc cho trẻ dưới 7 tuổi
Tác dụng phụ:	Tác dụng phụ khi sử dụng quá liều Paracetamol và Codein phosphate: - Paracetamol liều cao có thể gây biến chứng dạ dày, suy gan cấp, dị ứng, nổi mẩn, giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu, choáng, mệt mỏi. - Codein phosphate liều cao có thể gây buồn ngủ, khoan khoái, gây lệ thuộc khi sử dụng kéo dài, ngoài ra còn gây táo bón và ức chế hô hấp.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	1. Nhận thức về các nguy cơ: Tổn thương gan, thận: Sử dụng quá liều hoặc kéo dài có thể gây tổn thương gan, suy thận, đặc biệt ở người có bệnh lý nền. Suy hô hấp: Codeine có thể gây ức chế hô hấp, nguy hiểm cho người mắc bệnh phổi hoặc có vấn đề về thần kinh trung ương. Phản ứng da nghiêm trọng: Nếu xuất hiện phát ban, loét da, hoặc triệu chứng dị ứng khác, ngừng thuốc ngay và báo bác sĩ. Nguy cơ nghiện thuốc: Sử dụng codeine lâu dài có thể gây lệ thuộc và hội chứng cai thuốc khi ngừng đột ngột. 2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ: Đau bụng, vàng da, buồn nôn kéo dài, dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa. Khó thở, thờ chậm hoặc nông, cảm giác mệt mỏi, lú lẫn. Phát ban nghiêm trọng, ngứa, sưng mắt, hoặc phản ứng dị ứng toàn thân. 3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác: Không tự ý dùng chung với thuốc giảm đau khác hoặc thuốc có chứa paracetamol để tránh quá liều. Thận trọng khi kết hợp với thuốc an thần, thuốc ngủ hoặc rượu vì có thể làm tăng nguy cơ suy hô hấp. 4. Những lời khuyên cho bệnh nhân: Uống thuốc đúng liều lượng, không tự ý tăng liều hoặc kéo dài thời gian sử dụng. Tránh rượu và các chất kích thích để giảm nguy cơ tác dụng phụ nghiêm trọng. Nếu có triệu chứng bất thường, ngừng thuốc và liên hệ bác sĩ ngay.