



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

Hoạt chất:

Nồng độ/hàm lượng:

Nhóm thuốc:

Dạng bào chế:

Nhà sản xuất:

COFIDEC

Celecoxib

200mg

Thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm không steroid

Viên nang cứng

Lek Pharmaceuticals d.d - Slovenia

Chỉ định:	Thuốc Cofidec mg được chỉ định dùng trong các trường hợp sau: - Điều trị triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp dạng thấp. - Giảm nhẹ các dấu hiệu và triệu chứng của viêm cột sống dính khớp. - Kiểm soát đau cấp tính. - Điều trị thống kinh nguyên phát.
Cách sử dụng:	Nuốt cả viên thuốc cùng với một cốc nước. Nên dùng thuốc vào cùng một thời điểm trong ngày, uống cùng với thức ăn
Liều dùng thông thường:	Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường: Sử dụng 1-2 viên/ngày
Tác dụng phụ:	Thuốc có thể gây khó chịu dạ dày, buồn nôn, đầy hơi hoặc đau đầu nhẹ. Một số trường hợp có thể thấy chóng mặt, buồn ngủ hoặc phản ứng da nhẹ như phát ban. Thuốc có thể ảnh hưởng đến huyết áp, thận hoặc gây phản ứng dị ứng.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	<ol style="list-style-type: none">Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc: Thuốc có thể làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ nếu dùng lâu dài. Có thể gây viêm loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, đặc biệt ở người cao tuổi. Một số trường hợp hiếm có thể gây phản ứng da nghiêm trọng hoặc dị ứng nặng.Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ: Đau ngực, khó thở, phù chân, mệt mỏi bất thường. Vàng da, nước tiểu sẫm màu, buồn nôn hoặc chán ăn kéo dài. Phát ban, sưng mắt, ngứa nghiêm trọng, hoặc khó thở.Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác: Không tự ý dùng aspirin, thuốc chống viêm khác hoặc thuốc chống đông máu. Thận trọng khi dùng chung với thuốc điều trị tiểu đường, tăng huyết áp hoặc thuốc lợi tiểu. Nếu đang dùng thuốc khác, hãy hỏi bác sĩ để tránh tương tác thuốc.Những lời khuyên cho bệnh nhân: Uống thuốc cùng thức ăn để giảm kích ứng dạ dày. Tránh rượu, thuốc lá để giảm nguy cơ tác dụng phụ. Hạn chế tiếp xúc ánh nắng, dùng kem chống nắng nếu cần. Uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ chức năng thận. Nếu gặp bất kỳ triệu chứng bất thường nào, ngừng thuốc và liên hệ bác sĩ ngay.