



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC DALACIN C
Hoạt chất: Clindamycin
Nồng độ/hàm lượng: 300mg
Nhóm thuốc: Kháng sinh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Nhà sản xuất: Fareva Amboise - Pháp

Chỉ định:	<p>Điều trị các nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nhiễm khuẩn da và mô mềm: <ul style="list-style-type: none"> Nhiễm khuẩn vết thương sau phẫu thuật chỉnh hình. Áp-xe, viêm mô tế bào, nhiễm trùng tại vết thương sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Nhiễm khuẩn xương và khớp: <ul style="list-style-type: none"> Viêm tủy xương. Viêm khớp nhiễm khuẩn, đặc biệt sau phẫu thuật hoặc chấn thương. Một số nhiễm khuẩn khác
Cách sử dụng:	Clindamycin hydroclorid viên nang dùng đường uống. Để tránh khả năng kích thích thực quản nên uống viên clindamycin hydroclorid với một cốc nước đầy. Có thể uống trước ăn hoặc sau ăn
Liều dùng thông thường:	<p>Theo chỉ định của bác sĩ</p> <p>Liều thông thường:</p> <ul style="list-style-type: none"> Liều dùng cho người lớn: <ul style="list-style-type: none"> Nhiễm khuẩn cơ mức độ nhẹ đến trung bình: 1 viên x 3-4 lần/ ngày Liều dùng cho trẻ em (≥ 1 tháng tuổi): <ul style="list-style-type: none"> Nhiễm khuẩn nhẹ đến trung bình: 8-16 mg/kg/ngày chia làm 3-4 lần. Nhiễm khuẩn nặng: 16-20 mg/kg/ngày chia làm 3-4 lần.
Tác dụng phụ:	<p>Có thể gây ra một số tác dụng phụ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thường gặp: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, hoặc phát ban trên da. Hiếm gặp: Viêm đại tràng giả mạc (tiêu chảy nặng, phân có máu, đau bụng quặn thắt), hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng như khó thở, phát ban nặng, sưng môi, hoặc sưng
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	<ol style="list-style-type: none"> Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc <p>Thuốc có thể gây tiêu chảy kéo dài hoặc tiêu chảy nặng do nhiễm khuẩn Clostridium difficile. Nếu phân có máu hoặc đau bụng nhiều, cần báo ngay cho bác sĩ.</p> <p>Một số người có thể bị dị ứng với thuốc, biểu hiện như phát ban, ngứa, sưng môi, khó thở. Nếu có dấu hiệu này, ngừng thuốc ngay và liên hệ bác sĩ.</p> <p>Khi uống viên nang clindamycin, nếu không uống đủ nước, có thể gây kích ứng hoặc loét thực quản.</p> Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ <p>Tiêu chảy kéo dài, phân có máu hoặc đau bụng dữ dội.</p> <p>Phát ban, sưng mắt, khó thở hoặc các dấu hiệu dị ứng khác.</p> <p>Đau hoặc co thắt bụng, buồn nôn hoặc các triệu chứng tiêu hóa bất thường kéo dài.</p> Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác <p>Báo với bác sĩ nếu bạn đang dùng thuốc kê đơn, không kê đơn hoặc thực phẩm chức năng.</p> <p>Nếu có tiền sử bệnh viêm đại tràng hoặc bệnh đường ruột, cần thông báo với bác sĩ trước khi sử dụng.</p> <p>Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc.</p> Những lời khuyên cho bệnh nhân <p>Uống thuốc đúng liều và đủ thời gian theo chỉ định, ngay cả khi cảm thấy đỡ bệnh.</p> <p>Khi uống viên nang, nên uống cùng một ly nước đầy để tránh kích ứng thực quản.</p> <p>Thuốc có thể uống trước hoặc sau bữa ăn, không cần phụ thuộc vào thời điểm ăn uống.</p> <p>Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, hãy liên hệ bác sĩ ngay để được hỗ trợ kịp thời.</p>