



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

Hoạt chất:
Nồng độ/hàm lượng:
Nhóm thuốc:
Dạng bào chế:
Nhà sản xuất:

GOLDPROFEN 400

Ibuprofen
400mg
Thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm không steroid
Viên nén bao phim
Farmalabor - Bồ Đào Nha

Chỉ định:	- Chống đau và viêm mức độ nhẹ và vừa: đau bụng kinh, nhức đầu, thủ thuật về răng, đau sau phẫu thuật - Điều trị viêm khớp dạng thấp, viêm khớp dạng thấp thiếu niên - Hạ sốt ở trẻ em
Cách sử dụng:	Dùng đường uống, uống sau khi ăn
Liều dùng thông thường:	Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường: Người lớn: 1 viên x 3-4 lần/ngày Trẻ em: Liều thông thường để giảm đau hạ sốt là 20-30 mg/kg/ngày, chia làm 3-4 lần dùng trong 1 ngày. - Nếu trẻ dưới 7kg thì không khuyến cáo sử dụng - Nếu trẻ cân nặng dưới 30kg thì liều tối đa hằng ngày 500mg
Tác dụng phụ:	Tác dụng không mong muốn hay gặp khi dùng thuốc Goldprofen: Sốt, mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn, nôn, nhức đầu, hoa mắt chóng mặt, bồn chồn, mất ngủ, ngoại ban.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	1. Nhận thức về các nguy cơ: Tim mạch: Dùng lâu dài có thể tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ, đặc biệt ở người có bệnh tim mạch. Tiêu hóa: Nguy cơ loét dạ dày, xuất huyết tiêu hóa có thể xảy ra mà không có dấu hiệu báo trước. Phản ứng da: Có thể gây dị ứng da nghiêm trọng, nếu phát ban hoặc sưng mắt, cần ngừng thuốc ngay. 2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ: Đau ngực, khó thở, phù chân bất thường. Đau bụng dữ dội, nôn ra máu hoặc phân đen. Vàng da, nước tiểu sẫm màu, ngứa, phát ban. 3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác: Không tự ý dùng chung với aspirin, NSAID khác, thuốc chống đông máu hoặc thuốc lợi tiểu. Nếu có bệnh huyết áp cao, tiểu đường, bệnh thận, cần hỏi bác sĩ trước khi dùng. 4. Những lời khuyên cho bệnh nhân: Uống thuốc sau ăn để giảm kích ứng dạ dày. Hạn chế rượu bia và thuốc lá để giảm nguy cơ tác dụng phụ. Uống đủ nước hàng ngày để hỗ trợ chức năng thận. Không lái xe hoặc vận hành máy móc nếu thấy buồn ngủ, chóng mặt. Nếu gặp dấu hiệu bất thường, ngừng thuốc và liên hệ bác sĩ ngay.