



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

Hoạt chất:

Nồng độ/hàm lượng:

Nhóm thuốc:

Dạng bào chế:

Nhà sản xuất:

HAPACOL

Paracetamol

500 mg

Thuốc giảm đau, hạ sốt

Viên nén

Dược Hậu Giang - Việt Nam

Chỉ định:	Điều trị các triệu chứng: đau do đau đầu, đau nửa đầu, đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau họng, đau nhức cơ xương, đau do viêm khớp, đau sau khi tiêm ngừa hay nhổ răng, đau do hành kinh. Ngoài ra, còn làm hạ sốt ở người bị cảm hay những bệnh có liên quan đến sốt.
Cách sử dụng:	dùng bằng đường uống, uống sau khi ăn và uống với nhiều nước
Liều dùng thông thường:	Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường: - Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi uống 1 viên/lần. Nếu đau nhiều, bạn có thể uống 2 viên/lần. - Khoảng cách giữa 2 lần uống phải hơn 4 giờ và không quá 8 viên/ngày.
Tác dụng phụ:	Thuốc có thể gây một số phản ứng không mong muốn, bao gồm dị ứng, khó chịu tiêu hóa hoặc ảnh hưởng đến gan và thận khi dùng liều cao trong thời gian dài. Một số trường hợp hiếm có thể gặp vấn đề về máu hoặc phản ứng quá mẫn. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường như mệt mỏi kéo dài, vàng da hoặc phản ứng dị ứng, hãy ngừng thuốc và báo ngay cho bác sĩ.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	1. Nhận thức về các nguy cơ: Dùng quá liều có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng, đặc biệt khi sử dụng nhiều sản phẩm chứa paracetamol hoặc uống rượu thường xuyên. Một số thuốc trị cảm lạnh, ho hoặc giảm đau khác cũng có chứa paracetamol, cần cẩn trọng để tránh quá liều. 2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ: Nếu có dấu hiệu bất thường như vàng da, đau bụng dữ dội, buồn nôn kéo dài hoặc phản ứng dị ứng (phát ban, sưng mắt, khó thở), hãy ngừng thuốc và báo ngay cho bác sĩ. 3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác: Hãy thông báo với bác sĩ nếu đang sử dụng thuốc khác, đặc biệt là thuốc trị cảm cúm, thuốc giảm đau, thuốc chống đông máu hoặc thực phẩm chức năng để tránh tương tác không mong muốn. 4. Những lời khuyên cho bệnh nhân: Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng, tuân thủ đúng liều lượng và không dùng chung thuốc của người lớn cho trẻ em. Hạn chế hoặc tránh uống rượu trong khi dùng thuốc để bảo vệ gan.