



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

Hoạt chất:
Nồng độ/hàm lượng:
Nhóm thuốc:
Dạng bào chế:
Nhà sản xuất:

KAGASDINE

Omeprazol
20mg
Thuốc chống loét tiêu hoá
Viên nang cứng
Dược phẩm Khánh Hoà - Việt Nam

Chỉ định:	Điều trị loét dạ dày - tá tràng Hỗ trợ phòng ngừa loét dạ dày - tá tràng do thuốc kháng viêm
Cách sử dụng:	Uống trước ăn 30 phút Nuốt nguyên viên thuốc với nửa cốc nước, không nhai hay nghiền viên thuốc
Liều dùng thông thường:	Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường: Uống 1-2 viên/ngày
Tác dụng phụ:	Thuốc này có thể gây ra một số tác dụng phụ thường gặp và hiếm gặp: - Tác dụng phụ thường gặp: Có thể gây rối loạn tiêu hóa (đầy bụng, tiêu chảy, buồn nôn hoặc táo bón) và nhức đầu. - Tác dụng phụ ít gặp: Một số trường hợp có thể bị chóng mặt, phát ban hoặc đau bụng.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	1. Nhận thức về nguy cơ khi sử dụng thuốc Uống lâu dài có thể giảm hấp thu canxi, magie, vitamin B12, tăng nguy cơ loãng xương, thiếu máu. Có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường ruột, tiêu chảy do Clostridium difficile. 2. Dấu hiệu cần báo cho bác sĩ Dị ứng: Phát ban, sưng mặt, khó thở. Tiêu hóa: Đau bụng nặng, tiêu chảy kéo dài, phân đen. Thiếu hụt vitamin, khoáng chất: Chuột rút, yếu cơ, đau xương. Quá liều: Lú lẫn, buồn ngủ, nhìn mờ, rối loạn nhịp tim. 3. Lưu ý khi dùng chung thuốc khác Tránh dùng chung với warfarin, clopidogrel mà không có chỉ định bác sĩ. Có thể dùng thuốc kháng acid, nhưng nên uống cách Omeprazole ít nhất 30 phút. 4. Hướng dẫn sử dụng Uống nguyên viên, không nhai, không nghiền. Uống trước bữa ăn 30 phút để đạt hiệu quả tốt nhất. Hạn chế rượu, cà phê, đồ cay nóng để hỗ trợ điều trị. Không tự ý ngừng thuốc để tránh hội chứng dội axit.