



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

LEOLEN FORTE

Hoạt chất:

Cytidin-5monophosphat disodium + Uridin

Nồng độ/hàm lượng:

5mg + 3mg

Nhóm thuốc:

Kháng sinh

Dạng bào chế:

Viên nang cứng

Nhà sản xuất:

OPC - Việt Nam

Chỉ định:	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ điều trị các bệnh lý thần kinh ngoại biên có liên quan đến bệnh xương khớp (đau dây thần kinh tọa, viêm rễ thần kinh...), do chuyển hóa (viêm đa dây thần kinh do tiểu đường hay nghiện rượu...), nhiễm Herpes zoster, hoặc do lạnh. - Hỗ trợ điều trị đau dây thần kinh mặt, thần kinh sinh ba, thần kinh gian sườn, đau thắt lưng.
Cách sử dụng:	Nên uống nguyên viên thuốc với một ly nước đầy, không nên tách, nghiền, nhai. Tốt nhất nên uống sau bữa ăn
Liều dùng thông thường:	<p>Theo chỉ định của bác sĩ</p> <p>Liều thông thường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người lớn và trẻ em từ 15 tuổi: Uống mỗi lần 1 - 2 viên, ngày 2 lần. - Trẻ em từ 7 đến dưới 15 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần. - Trẻ em từ 4 đến dưới 7 tuổi: Uống mỗi lần 1 viên, ngày 1 lần. - Trẻ em dưới 4 tuổi: Không dùng do dạng bào chế không phù hợp.
Tác dụng phụ:	<p>Không có tác dụng phụ nào nghiêm trọng</p> <p>Nếu bệnh nhân bị động kinh hoặc co thắt cơ thì nên thận trọng</p>
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc Quá liều: Thuốc có độc tính thấp nên ít khi gây quá liều. Tuy nhiên, nếu gặp bất kỳ triệu chứng bất thường nào, cần báo ngay cho bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế gần nhất. Dị ứng: Ngừng thuốc ngay nếu có dấu hiệu phát ban, ngứa, khó thở, hoặc sưng mắt, môi, lưỡi. 2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ Xuất hiện phát ban, ngứa, khó thở hoặc các dấu hiệu dị ứng nghiêm trọng. Bất kỳ phản ứng bất thường nào khác mà trước đây chưa từng gặp. 3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác Hiện chưa có báo cáo về tương tác thuốc, nhưng vẫn cần thông báo cho bác sĩ về tất cả các thuốc đang sử dụng, bao gồm thuốc kê đơn, không kê đơn, và thực phẩm chức năng. 4. Những lời khuyên cho bệnh nhân Uống thuốc sau bữa ăn để giúp hấp thu tốt hơn và giảm kích ứng dạ dày (nếu có). Uống thuốc đúng liều, đúng thời gian theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu quên liều, uống ngay khi nhớ ra. Nếu gần đến liều tiếp theo, bỏ qua liều quên và tiếp tục lịch uống thuốc như bình thường, không dùng gấp đôi liều. Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc, có thể sử dụng bình thường.