



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

NEURONTIN

Hoạt chất:

Gabapentin

Nồng độ/hàm lượng:

300mg

Nhóm thuốc:

Giảm đau thần kinh

Dạng bào chế:

Viên nang cứng

Nhà sản xuất:

Pfizer - Đức

Chỉ định:	<ul style="list-style-type: none">- Giảm đau thần kinh cho người lớn từ 18 tuổi trở lên- Động kinh: hỗ trợ động kinh cục bộ, có hoặc không kèm theo động kinh toàn bộ thứ phát ở người lớn và trẻ em trên 12 tuổi- Rối loạn lo âu lan tỏa ở người lớn.- Giảm đau cơ xơ hóa
Cách sử dụng:	Gabapentin được dùng đường uống, có thể dùng cùng hoặc không cùng thức ăn.
Liều dùng thông thường:	Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường: <ul style="list-style-type: none">- Người lớn: 1 viên x 3 lần/ngày- Trẻ em chỉ sử dụng cho bệnh động kinh cục bộ, không dùng để giảm đau thần kinh
Tác dụng phụ:	Các tác dụng phụ thường gặp khi sử dụng thuốc bao gồm: Buồn ngủ, chóng mặt, mất phối hợp các động tác, cơ thể mệt mỏi, nhìn mờ hoặc nhìn đôi, chuyển động nhãn cầu bất thường hoặc rung giật.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	<ol style="list-style-type: none">Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc Tăng nguy cơ tự tử: Thuốc có thể làm tăng suy nghĩ hoặc hành động tự tử, đặc biệt ở bệnh nhân động kinh hoặc rối loạn tâm thần. Cần theo dõi các dấu hiệu trầm cảm, lo âu hoặc thay đổi hành vi. Ngừng thuốc đột ngột: Việc ngừng thuốc đột ngột có thể làm tăng tần suất co giật. Luôn giảm liều từ từ theo chỉ định của bác sĩ. Tác động thần kinh: Có thể gây chóng mặt, buồn ngủ, mất thăng bằng, hoặc giảm tập trung. Tránh lái xe hoặc vận hành máy móc nếu cảm thấy bị ảnh hưởng.Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ Cảm thấy chán nản, lo âu hoặc có suy nghĩ tiêu cực. Chóng mặt nghiêm trọng, buồn ngủ kéo dài hoặc mất tập trung đáng kể. Co giật hoặc tình trạng động kinh trở nên tồi tệ hơn. Phát ban, ngứa hoặc các dấu hiệu dị ứng khác. Thị lực thay đổi bất thường như nhìn mờ hoặc mất thị lực.Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác Tránh dùng chung với rượu, thuốc an thần hoặc thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương vì có thể làm tăng tác dụng phụ. Nếu đang sử dụng thuốc điều trị đau thần kinh, động kinh, trầm cảm hoặc thuốc giảm đau opioid, cần báo với bác sĩ để tránh tương tác bất lợi.Những lời khuyên cho bệnh nhân Uống thuốc đúng theo chỉ định, không tự ý tăng hoặc giảm liều. Nếu quên liều, uống ngay khi nhớ ra, nhưng không dùng gấp đôi liều trong một lần. Tránh rượu bia vì có thể làm tăng tác dụng phụ như chóng mặt và buồn ngủ. Theo dõi và ghi nhận tình trạng co giật hoặc các triệu chứng bất thường để hỗ trợ điều trị tốt hơn.