



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

Hoạt chất:

Nồng độ/hàm lượng:

Dạng bào chế:

Nhà sản xuất:

OTIBONE

Glucosamin

1500 mg

Bột pha dung dịch uống

Boston - Việt Nam

Chỉ định:	Giảm triệu chứng thoái hóa khớp gối nhẹ và trung bình
Cách sử dụng:	Dùng đường uống, pha với nước, uống cùng hoặc trước bữa ăn.
Liều dùng thông thường:	Theo chỉ định của bác sĩ Uống 1 gói Oribone 1500 mg/ngày. Sử dụng ít nhất liều dùng liên tục trong 1 - 3 tháng để đảm bảo hiệu quả điều trị.
Tác dụng phụ:	Tác dụng phụ thường rất nhẹ và thoáng qua. Rất hiếm khi xảy ra rối loạn tiêu hóa, buồn ngủ, nhức đầu và đỏ da.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	<p>1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc Dị ứng: Không dùng nếu có tiền sử dị ứng với glucosamine hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. Tăng đường huyết: Glucosamine có thể ảnh hưởng đến đường huyết, bệnh nhân tiểu đường cần thận trọng khi sử dụng. Rối loạn đông máu: Có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, đặc biệt khi dùng chung với thuốc chống đông máu. Hiệu quả chậm: Tác dụng giảm đau có thể xuất hiện sau 1 tuần, không thay thế thuốc giảm đau tức thì.</p> <p>2. Dấu hiệu cần báo cho bác sĩ Dấu hiệu dị ứng: Phát ban, ngứa, sưng mắt, môi, họng hoặc khó thở. Vấn đề tiêu hóa: Buồn nôn, tiêu chảy hoặc đau bụng kéo dài. Rối loạn đông máu: Bầm tím bất thường, chảy máu kéo dài.</p> <p>Thay đổi đường huyết: Lượng đường trong máu tăng hoặc giảm bất thường.</p> <p>3. Tuân thủ liệu trình điều trị Dùng đúng liều: Không tự ý tăng liều, đặc biệt khi có bệnh lý nền. Theo dõi đường huyết: Nếu có tiền sử tiểu đường, cần kiểm tra đường huyết thường xuyên. Kiên trì sử dụng: Thuốc có tác dụng chậm, cần thời gian để phát huy hiệu quả trong hỗ trợ xương khớp.</p> <p>4. Lưu ý đặc biệt Không dùng cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú: Chưa có dữ liệu an toàn đầy đủ. Không dùng cho trẻ dưới 18 tuổi: Hiệu quả và độ an toàn chưa được xác định.</p>