



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

TAVANIC

Hoạt chất:

Levofloxacin

Nồng độ/hàm lượng:

500mg

Nhóm thuốc:

Kháng sinh

Dạng bào chế:

Viên nén bao phim

Nhà sản xuất:

Opella Healthcare International SAS - Pháp

Chỉ định:	<p>Điều trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với Levofloxacin gây ra ở người lớn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiễm khuẩn da và mô mềm - Các nhiễm khuẩn khác: Viêm phổi mắc phải cộng đồng, Nhiễm khuẩn đường tiết niệu phức tạp (kể cả viêm thận - bể thận), Viêm tuyến tiền liệt nhiễm khuẩn mạn tính.
Cách sử dụng:	<p>Dùng đường uống. Có thể uống thuốc trong bữa ăn hoặc bất cứ lúc nào giữa các bữa ăn. Viên Tavanic có thể được chia theo khía ngang để phân liều thích hợp.</p>
Liều dùng thông thường:	<p>Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường: Người lớn: Uống 1/2-1 viên - 1-2 lần/ngày. Thời gian điều trị thường kéo dài từ 7-14 ngày tùy thuộc vào mức độ nhiễm trùng và chỉ định của bác sĩ.</p>
Tác dụng phụ:	<p>Có thể gây ra một số tác dụng phụ như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thường gặp: Buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, hoặc tăng enzym gan trong máu. - Ít gặp: Ngứa, phát ban trên da, rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, hoặc đau đầu, chóng mặt. - Hiếm gặp: Viêm hoặc đau gân (đặc biệt gân gót), tiêu chảy nặng hoặc có máu, cảm giác tê rần hoặc nóng rát (dấu hiệu của tổn thương dây thần kinh), hoặc phản ứng dị ứng nghiêm trọng như khó thở, sưng môi, mặt, họng.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	<p>1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc Dị ứng nghiêm trọng: Một số người có thể bị phản ứng dị ứng nặng như phát ban, sưng mắt, môi, họng hoặc khó thở. Nếu gặp dấu hiệu này, ngừng thuốc ngay và báo bác sĩ. Tổn thương gân: Thuốc có thể gây viêm hoặc đứt gân, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc đang dùng corticosteroid. Nếu thấy đau hoặc sưng tấy vùng gân (đặc biệt ở gót chân), cần báo ngay cho bác sĩ. Ảnh hưởng thần kinh: Một số bệnh nhân có thể bị tê rần, cảm giác kim châm hoặc yếu cơ. Nếu gặp các triệu chứng này, nên báo với bác sĩ sớm. Nhạy cảm với ánh sáng: Da có thể nhạy cảm hơn với ánh nắng, dễ bị bỏng nắng. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và dùng kem chống nắng khi ra ngoài. Tiêu chảy kéo dài: Nếu bị tiêu chảy nghiêm trọng hoặc phân có máu, có thể là dấu hiệu viêm ruột do thuốc, cần liên hệ ngay với bác sĩ.</p> <p>2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ Xuất hiện phát ban, ngứa, khó thở, hoặc sưng môi, mặt. Tiêu chảy nặng, đau bụng kéo dài hoặc phân có máu. Đau hoặc viêm vùng gân, đặc biệt ở gót chân. Chóng mặt, lú lẫn, hoặc tê rần bất thường ở tay chân.</p> <p>3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác Báo với bác sĩ nếu đang sử dụng thuốc điều trị tiểu đường hoặc thuốc chống đông máu để tránh tương tác thuốc.</p> <p>4. Những lời khuyên cho bệnh nhân Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dùng thuốc và vài ngày sau khi ngừng thuốc. Khi ra ngoài, sử dụng kem chống nắng và mặc quần áo bảo vệ. Uống thuốc đúng liều, đúng thời gian được kê đơn, không tự ý ngừng thuốc để tránh vi khuẩn kháng thuốc. Uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ chức năng thận và giảm nguy cơ tác dụng phụ. Nếu cảm thấy chóng mặt hoặc buồn ngủ, tránh lái xe hoặc vận hành máy móc cho đến khi biết rõ thuốc ảnh hưởng đến mình thế nào.</p>