



THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

VOLTAREN 75mg

Hoạt chất:

Diclofenac

Nồng độ/hàm lượng:

75mg

Nhóm thuốc:

Thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng viêm không steroid

Dạng bào chế:

Viên nén phóng thích chậm

Nhà sản xuất:

Novartis Farma S.p.A. - Ý

Chỉ định:	Tình trạng viêm và các dạng thoái hóa của các khớp Đau, viêm và sưng sau chấn thương hoặc sau phẫu thuật
Cách sử dụng:	Dùng qua đường uống. Nên nuốt toàn bộ viên thuốc với thức uống, tốt nhất là trong bữa ăn Không được bẻ hoặc nhai viên thuốc
Liều dùng thông thường:	Theo chỉ định của bác sĩ Liều thông thường: 1-2 viên/ngày
Tác dụng phụ:	Khi sử dụng thuốc, bệnh nhân có thể gặp một số tác dụng phụ ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể: - Thuốc có thể gây phù, giữ nước, tăng huyết áp hoặc làm nặng thêm tình trạng suy tim ở những bệnh nhân có nguy cơ. Ngoài ra, bệnh nhân có thể cảm thấy đau đầu, chóng mặt hoặc buồn ngủ. Trên da, có thể xuất hiện phát ban, nổi mề đay, viêm da tiếp xúc hoặc tăng nhạy cảm với ánh sáng. - Thuốc cũng có khả năng gây rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu, loét dạ dày hoặc thậm chí xuất huyết tiêu hóa. Với hệ tiết niệu, nguy cơ suy thận cấp hoặc hội chứng thận hư có thể xảy ra. Một số trường hợp có thể bị thiếu máu, bầm tím, hoặc thời gian chảy máu kéo dài. Đối với những người nhạy cảm với aspirin, thuốc có thể gây khó thở.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc: Tổn thương dạ dày và đường tiêu hóa: Thuốc có thể gây kích ứng dạ dày, loét dạ dày-tá tràng, xuất huyết tiêu hóa. Tăng huyết áp và ảnh hưởng tim mạch: Diclofenac có thể làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ tim mạch nếu sử dụng lâu dài. Tổn thương thận: Có thể gây suy giảm chức năng thận, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc có bệnh lý thận từ trước. 2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ: Đau bụng dữ dội, đi ngoài phân đen, nôn ra máu (dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa). Sưng phù, giảm lượng nước tiểu, khó thở (dấu hiệu suy thận). Đau đầu, tăng huyết áp, hoa mắt, đau ngực (dấu hiệu ảnh hưởng tim mạch). Phát ban, sưng môi, khó thở (dấu hiệu dị ứng nặng). 3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về sử dụng các thuốc khác: Thuốc chống đông (Warfarin, Heparin): Nguy cơ chảy máu tăng cao khi dùng chung. Thuốc lợi tiểu, thuốc tăng huyết áp: Diclofenac có thể làm giảm tác dụng của các thuốc này. Thuốc điều trị tiểu đường: Có thể làm thay đổi đường huyết, cần theo dõi thường xuyên. 4. Những lời khuyên cho bệnh nhân: Uống thuốc cùng thức để giảm kích ứng dạ dày. Tránh uống rượu, hút thuốc vì có thể làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày. Không tự ý dùng thêm thuốc giảm đau khác khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ. Tránh lái xe hoặc vận hành máy móc nếu thấy chóng mặt, buồn ngủ khi dùng thuốc.