



BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHÍNH HÌNH
ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC - DUỢC LÂM SÀNG

THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn



TÊN THUỐC

ZINNAT 250

Hoạt chất:

Cefuroxim

Nồng độ/hàm lượng:

250mg

Nhóm thuốc:

Kháng sinh

Dạng bào chế:

Viên nén bao phim

Nhà sản xuất:

Glaxo Operations UK Limited - Anh Quốc

Chỉ định:	Điều trị các nhiễm trùng do vi khuẩn nhạy cảm, bao gồm: - Nhiễm trùng da và mô mềm: Các trường hợp nhiễm khuẩn vết thương sau phẫu thuật chỉnh hình, nhiễm trùng mô mềm liên quan đến chấn thương hoặc phẫu thuật cơ xương khớp, và các bệnh lý nhiễm khuẩn da như nhọt, chốc lở. - Nhiễm trùng xương và khớp: Thuốc có thể được chỉ định trong các trường hợp viêm tủy xương hoặc nhiễm trùng khớp, đặc biệt sau phẫu thuật chỉnh hình. - Nhiễm trùng khác
Cách sử dụng:	Nên uống ZINNAT sau khi ăn để đạt được hấp thu tối ưu
Liều dùng thông thường:	Theo chỉ định của bác sĩ Người lớn: Nhiễm khuẩn da, mô mềm và xương khớp: Uống 1-2 viên x 2 lần mỗi ngày. Thời gian điều trị thường kéo dài từ 5-14 ngày tùy thuộc vào mức độ nhiễm trùng và chỉ định của bác sĩ. Trẻ em: Dựa vào khối lượng cơ thể. Dùng 20-30mg/kg/ngày, chia làm 2 lần uống.
Tác dụng phụ:	Thuốc này có thể gây ra một số tác dụng phụ thường gặp và hiếm gặp: - Tác dụng phụ thường gặp: Buồn nôn, nôn, tiêu chảy, hoặc phân lỏng. - Tác dụng phụ ít gặp: Phản ứng dị ứng như phát ban, ngứa, hoặc sưng môi.
Khuyến cáo cho bệnh nhân:	1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc Thuốc có thể gây tiêu chảy do ảnh hưởng đến vi khuẩn đường ruột. Nếu tiêu chảy kéo dài, có máu hoặc đau bụng nhiều, cần báo ngay cho bác sĩ. Một số người có thể bị dị ứng với thuốc, biểu hiện như phát ban, ngứa, sưng môi hoặc khó thở. Nếu có dấu hiệu này, ngừng thuốc ngay và liên hệ bác sĩ. 2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ Tiêu chảy nặng, phân có máu, đau bụng kéo dài. Phát ban, sưng mắt, khó thở hoặc bất kỳ dấu hiệu dị ứng nào. Vàng da, nước tiểu sẫm màu, mệt mỏi bất thường. 3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác Báo với bác sĩ nếu bạn đang dùng thuốc kê đơn, không kê đơn hoặc thực phẩm chức năng. Không tự ý dùng chung với thuốc khác mà chưa có sự đồng ý của bác sĩ. Thuốc không có tác dụng với virus, không dùng để điều trị cảm cúm hoặc cảm lạnh. 4. Những lời khuyên cho bệnh nhân Uống thuốc đúng liều và đủ thời gian theo chỉ định, ngay cả khi thấy đỡ bệnh. Uống nhiều nước để hỗ trợ cơ thể trong quá trình điều trị và giảm nguy cơ tác dụng phụ. Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào, hãy liên hệ bác sĩ ngay để được hỗ trợ kịp thời.